



Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de febrero de 2017
DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1




ASIGNATURA/AREA: Geometría	FECHA: Agosto de 2025
PERIODO: 2 de 2025	GRADO: 10° (10°1, 10°2)
NOMBRE DEL DOCENTE: Jaime Buelvas	
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	
FECHA DE ENTREGA: agosto 18 de 2025	FECHA DE SUSTENTACIÓN: Según horario organizado por coordinación.
LOGROS: Identificación, construcción y aplicación de los elementos básicos de la recta a partir de sus gráficas en el plano. Reconocimiento y aceptación de sus fortalezas y debilidades en la actividad académica.	
Recursos: Hojas de bloc, lápiz, borrador, regla, lápices de colores, textos de matemáticas e internet.	

PLAN DE APOYO

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:	
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO	FECHA DE SUSTENTACIÓN
NOMBRE DEL EDUCADOR: Jaime Buelvas	FIRMA DEL EDUCADOR

TEORÍA, EXPLICACIONES Y BIBLIOGRAFÍA





ECUACIÓN DE LA RECTA: Representación gráfica de la línea recta


En toda igualdad de la forma $ax + by = c$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$, representa una ecuación lineal con dos incógnitas, las soluciones son pares ordenados de la forma (x, y) . Este par ordenado (x, y) corresponde a un punto del plano cartesiano.

Ejemplo: la ecuación $L: x + y = 4$

Tabla de valores

x	y	(x, y)
2	2	(2, 2)
1	3	(1, 3)
0	4	(0, 4)
-1	5	(-1, 5)

Gráfico




- A toda ecuación lineal (de primer grado) con dos incógnitas le corresponde gráficamente una recta.
- Cada par ordenado de números (x, y) corresponde a las coordenadas de un punto que es solución de la ecuación dada, es decir satisface esta ecuación.
- Los puntos que cada par ordenado representa pertenecen a la recta correspondiente.

PENDIENTE DE UN RECTA

Se denomina pendiente "m" de una recta al grado de inclinación " α " que tiene respecto del eje de las abscisas (eje x). Teniendo en cuenta el ángulo " α ", la inclinación está dada por su tangente, que si recordamos es el lado opuesto dividido el lado adyacente al mismo, por lo que tenemos:

$$\text{tag} \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



En geometría analítica representamos a la pendiente con "m", por lo tanto reemplazando las variaciones de x e y , se tiene:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1

Observaciones:

- La pendiente es positiva cuando la recta esta inclinada hacia la derecha.
- La pendiente es cero cuando la recta es horizontal.
- La pendiente es negativa cuando la recta esta inclinada hacia la izquierda.
- Conforme el valor absoluto de la pendiente es mayor, la recta esta mas inclinada.
- Una recta vertical no tiene pendiente.

Ecuación de la línea recta

Toda igualdad de la forma $ax + by = c$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$, también se puede escribir en la forma $y = mx + n$, es decir como una función, donde m es la pendiente o *coeficiente de dirección* y n es la intersección de la recta con el eje y , llamada también *coeficiente de posición*.

De esta forma, podemos afirmar que una recta está perfectamente definida si se conocen: **dos puntos de ella**

Ecuación punto- Pendiente

Su forma general; $y - y_1 = m(x - x_1)$, la aplicamos para hallar la ecuación de la recta, $y = mx + n$, cuando conocemos un punto y la pendiente

Ejemplo: Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(2, -5)$ y tiene pendiente -4

Como, el punto dado es $A(2, -5)$ con $x = 2$ e $y = -5$ y el valor de la pendiente es $m = -4$

Reemplazamos la fórmula de ecuación de la recta $y - y_1 = m(x - x_1)$ y se tiene

$y - (-5) = -4(x - 2)$, aplicando la propiedad distributiva tenemos:

$y + 5 = -4x + 8$, para obtener la ecuación general igualamos a cero y reducimos los términos semejantes. que es la ecuación pedida


$$y + 4x - 3 = 0$$

Perpendicular: Simplemente significa **en ángulos rectos (90°)**, o sea cuando dos rectas se cortan y su intersección forma un ángulo de 90° .




Institución Educativa Juan XXIII

Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017
DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1



Paralelas: Dos líneas son paralelas si siempre están a la misma distancia (se llaman "equidistantes"), y no se van a encontrar nunca. (También apuntan en la misma dirección). Sólo recuerda:


Siempre la misma distancia y no se encuentran nunca.



Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son recíprocas y de signos contrarios.

Una recta está determinada por su pendiente (m) con sus coordenadas (x_1, y_1) de un punto de ella misma. Se determina la ecuación en X y Y que satisfaga las coordenadas (X, Y) de cualquier punto de la recta y que no satisfaga por ningún otro para cualquiera de números reales.

Si $P(x, y)$ es un punto cualquiera del plano $x y$:





Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1

La pendiente de la recta que une P con el punto dado Q (x_1 y_1) es: $m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$

y esto es un m (pendiente), si P(x , y) está sobre la recta específica, por lo tanto tenemos que:

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

Y la ecuación de la recta es: $y - y_1 = m(x - x_1)$

EJEMPLO

Escribir la ecuación de una recta cuya pendiente es: $\frac{2}{3}$ y pasa por el punto Q (- 4, 2)

Datos:

$$m = \frac{2}{3}$$

$$Q = (-4, 2)$$

$$X_1 = -4$$

$$Y_1 = 2$$

Solución:

Se sustituye en fórmula:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (2) = \left(\frac{2}{3}\right)(x - (-4))$$

$$y - 2 = \left(\frac{2}{3}\right)(x + 4)$$

$$y - 2 = \frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{8}{3} + 2$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{14}{3}$$

Hallar la ecuación de la recta que pasa por (-3, 4) y su pendiente es 2.

Solución: El punto conocido (x_1, y_1) = (-3, 4) y la pendiente $m = 2$, entonces sustituyendo en la ecuación se tiene:

$$y - 4 = 2(x - (-3))$$

$$y - 4 = 2x + 6$$

$$y = 2x + 6 + 4$$

$$y = 2x + 10$$

Ecuación de la recta conocidos dos puntos

EJEMPLO

Encontrar la ecuación de una recta que pasa por los puntos A (- 4, 3) B (6, - 2)



Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1

Solución:

Se sustituye en:

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

$$m = \frac{-2 - 3}{6 - (-4)} \quad \text{Se realizan las operaciones}$$

$$X_1 = -4$$

$$X_2 = 6$$

$$Y_1 = 3$$

$$Y_2 = -2$$

$$m = \frac{-5}{10}$$

Se simplifica:

$$\therefore m = -\frac{1}{2}$$

A hora para obtener la ecuación tenemos:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = \frac{-1}{2}x - 2$$

Se sustituyen los valores correspondientes:

$$y - 3 = \frac{-1}{2}(x - (-4))$$

$$y = \frac{-1}{2}x - 2 + 3$$

$$y - 3 = \frac{-1}{2}(x + 4)$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 1 \quad \text{Ecuación particular de la recta}$$

Halla la ecuación de la recta que pasa por $(-1,3)$ y $(2,0)$.

Solución: Sea $A(-1,3)$ y $B(2,0)$

Se calcula la pendiente $m = \frac{0 - 3}{2 - (-1)} = \frac{-3}{3} = -1$. Luego se escoge cualquier punto

por ejemplo $A(-1,3) = (x_1 - y_1)$, entonces reemplazando en la ecuación de la recta:

$$(y - y_1) = m(x - x_1)$$

$$(y - 3) = -1(x - (-1))$$

$$y = -x - 1 + 3$$

$$y = -x + 2$$

Ejemplo de rectas paralelas



Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1

Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(-2, -3)$ y es paralela a la recta $y = -2x + 1$

Solución: La recta dada es $y = -2x + 1$, entonces la pendiente $m_1 = -2$, por el criterio de paralelismo $m_2 = -2$.

Se utiliza el punto $(-2, -3)$ y lo sustituimos en la ecuación

$$\begin{aligned}y - y_1 &= m(x - x_1) \\y - (-3) &= -2(x - (-2)) \\y + 3 &= -2(x + 4) \\y &= -2x - 4 - 3 \\y &= -2x - 7\end{aligned}$$

Ejemplo de rectas perpendiculares

Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(-2, -3)$ y es perpendicular a $y = -2x + 1$.

Solución: La recta dada es $y = -2x + 1$, entonces la pendiente $m_1 = -2$, por el criterio de perpendicular $m_2 = \frac{1}{2}$

Se utiliza el punto $(-2, -3)$ y lo sustituimos en la ecuación

$$\begin{aligned}y - y_1 &= m(x - x_1) \\y - (-3) &= \frac{1}{2}(x - (-2)) \\y + 3 &= \frac{1}{2}(x + 2) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}2 \\y &= \frac{1}{2}x + 1 - 3 \\y &= \frac{1}{2}x - 2\end{aligned}$$

EJERCICIOS O TALLER PARA ESTUDIAR

INDICACIONES

El siguiente taller es un mecanismo de estudio, la evaluación para recuperar el segundo periodo se sacará con ejercicios parecidos a este taller

Este taller NO se entrega, la recuperación es una evaluación, por lo tanto la familia debe verificar que el estudiante realmente estudie a conciencia

Cada estudiante en supervisión del acudiente o padre de familia de ponerse al día con las actividades realizadas en clases y las diversas consultas y tareas planteadas, ponerse al día con el cuaderno con



Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1

todas las actividades desarrolladas a la fecha

Estudiar las competencias desarrolladas con los temas estudiados en el periodo:

Corregir, estudiar y analizar la evaluación de periodo y las actividades evaluadas en clase

Presentar la evaluación de plan de apoyo en la fecha programada por la Institución, la calificación sacada en la evaluación es la nota que quedará como definitiva del periodo como plan de apoyo

Se insta a la familia a hacer el acompañamiento respectivo para que el estudiante alcance los desempeños del área

Taller para prepararse para la evaluación
NO es para entregar

Encuentra la ecuación de la recta que:

1. Pasa por el punto $P(-1, 3)$ y cuya pendiente es -2
2. Pasa por los puntos $R(-1, 2)$ y $T(1, 7)$
3. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos $M(-1; -2)$ y $A(-5; 4)$
4. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto $(-1,2)$ y es paralela a la recta $-10x + 2y - 6 = 0$.
Rta: $y=5x+7$.
5. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-3,1)$ y es paralela a la recta que pasa por los puntos $(-3,-2)$ y $(-2,3)$.
Rta: $y=5x+16$.
6. Halla la ecuación de la recta que pasa por el vértice A del triángulo de vértices $A(2; 2)$, $B(3; -4)$ y $C(6; 1)$ y perpendicular al lado opuesto de dicho vértice.
7. Halla la ecuación de la recta que pasa por el origen del sistema de ejes coordenados y que tiene por pendiente 2.
Rta: $2x - y = 0$

Bibliografía y recursos digitales

<https://www.matematicaytrenes.cl/problemasrecta.pdf>

https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Recta_Ecuacion_de.html

<https://www.fisicalab.com/apartado/ecuacion-recta>

<https://www.youtube.com/watch?v=KEENQd0B5dI>

https://www.youtube.com/watch?v=07_oakGhaHY

https://www.youtube.com/watch?v=OxBg_0di558

<https://www.youtube.com/watch?v=ZIV6IBa-OA>

Nota: Recordar que la recuperación es una evaluación sobre este taller, no debe entregarlos, sino resolverlo a conciencia para la evaluación